

AVERTISSEMENTS AGRICOLES


(R)

STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE

Circonscription

PROVENCE, ALPES, CÔTE D'AZUR, CORSE
 SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
 Ancienne Conserverie de CASAMOZZA
 LUCCIANA - 20290 BORGIO -

 (95) 36.05.70


Edition Speciale Corse

Bulletin Technique n° 53

du 1er Avril 1985


VIGNE

Excoriose :


Le réchauffement de la température depuis une dizaine de jours a enfin permis le démarrage de la végétation. Niellucio et Alicante atteignent le stade de pointe verte.

Si le traitement d'hiver, à l'arsenite de soude n'a pas été réalisé, vous pouvez lutter contre l'excoriose au stade D (sortie des feuilles). Compte tenu du développement progressif de la végétation effectuer 2 applications.

- la 1ère quand 40 % des bourgeons ont atteint le stade D
- la 2ème quand 40 % des bourgeons ont atteint le stade E.

**C**

Pointe verte

**D**

Sortie des feuilles

**E**

Feuilles étalées

Les produits utilisables sont les suivants :
 (dose exprimée en g de matière active/hl)

- | | |
|---|---|
| - dichlofluanide à 200 g..... | EUPARENE |
| - dithianon à 50 g | DELAN |
| - folpel à 150 g..... | Nombreuses spécialités |
| - mancozèbe à 280 g | DITHANE M45, DITHANE LF, SANDOZEBE, KORZEBE |
| - métirane de zinc à 320 g..... | POLYRAM |
| - propinèbe à 280 g | ANTRACOL, ANTRACOL 6 |
| - folpel + captafol | MYCODIFOL F, MYCODIFOL Liquide |
| - folpel + mancozèbe | MANCOFOL |
| - cymoxanil + cuivre + captafol | SYPHAL, SYPHAL L |
| - cymoxanil + cuivre + zinèbe | CUPROFIX CZ activé |
| - cymoxanil + cuivre + zinèbe + folpel..... | CUPROFIX F activé |
| - cymoxanil + folpel + captafol | SYGAN, SYGAN L |
| - cymoxanil + folpel | ANTEOR |
| - cymoxanil + folpel + cuivre | ANTEOR C |
| - cymoxanil + mancozèbe | FULVAX, REMILTINE, REMILTINE S |
| - cymoxanil + mancozèbe + folpel | REMILTINE F |

P. 1.7

- cymoxanil + zinèbe + folpel NOVOFIX activé
- soufre mouillable MICROTHIOL, THIOVIT
- phosethyl al + folpel MIKAL
- phosethyl al + mancozèbe RHODAX

Avec ces 2 derniers produits, MIKAL, RHODAX, une seule application, quand 40 % des bourgeons sont au stade D, est normalement suffisante.

Toutefois, si le débourrement est très échelonné, on pourra compléter avec une 2ième application quand 40 % des bourgeons auront atteint le stade E.

N'associez pas votre premier anti-oidium au traitement anti-excoriose : ou c'est trop tard pour l'excoriose, la période de contaminations étant dépassée, ou c'est trop tôt pour l'oidium. Réservez le pour le stade 3 à 5 feuilles.

ARBRES FRUITIERS

Oïdium sur pêchers et nectarines

Sur variétés sensibles, une protection est nécessaire dès maintenant.

Matières actives utilisables :

- binapacryl - chinomethionate - dinocap - thiophanate methyl - pyrazophos - soufre micronisé - et triforine.

Cloque du pêcher :

Les infections peuvent se produire jusqu'à l'étalement des premières feuilles. Sur variétés sensibles, maintenir la protection, les premières attaques sont déjà visibles.

Thrips sur nectarines :

Les larves de cet insecte piquent le fruit dès sa formation. L'épiderme de celui-ci se **craquelle** au cours de sa croissance.

Si des dégâts ont été observés l'an dernier, intervenir dès le stade G (chute de plus de 50 % des pétales) avec :

- phosalone AZOFENE, ZOLONE si la floraison est étalée
- metamidophos TAMARON, ORTHOTOX) dans tous les autres cas
- acephate ORTHENE)

**Préservez les abeilles : elles préparent votre récolte !
Evitez de traiter les végétaux en floraison.
En cas de nécessité absolue, utilisez un insecticide " non dangereux pour les abeilles " et en dehors des heures les plus chaudes de la journée.**

TOMATES

Cladosporiose :

Les premières tâches sont apparues sous serre. Une bonne aération est un moyen efficace pour empêcher l'installation de cette maladie. Intervenez dès l'apparition des 1er symptômes en alternant les produits :

- chlorothalonil DICONIL
- fenarimol RIMIDINE, RUBIGAN
- manebe N.S.
- thiophanate methyl PELT
- triforine DENARIN, FUNGINEX, SAPROL

=====